

登革熱常見問題

Q1：登革熱傳染途徑？

A1：主要藉由病媒蚊叮咬人時將登革病毒傳入人體內，並不會由人直接傳染給人，也不會經由空氣或接觸傳染。

Q2：懷疑感染登革熱，詢問感染症狀為何？

A2：有些人症狀輕微，甚至不會出現生病症狀。而典型登革熱的症狀則是會有突發性的高燒（ $\geq 38^{\circ}\text{C}$ ），頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛及出疹等現象。

Q3：家人懷疑感染，並已送檢，詢問多久可確診？

A3：依採檢方式不同，檢驗所需的時間亦不相同，且仍需加上檢體送件時間，如欲知道檢驗結果，建議洽原採檢之衛生單位或醫療院所。

Q4：噴藥範圍？藥物對人體是否有影響？

A4：以病例住家、活動地點為中心，對病例周圍半徑至少50公尺地區作業。所使用之殺蟲劑，係仿照天然除蟲菊精分子構造，以人工合成之合成除蟲菊精類殺蟲劑，對蚊蟲具擊昏、致死效果，對人畜毒性低。噴藥完，建議等30分鐘後再戴口罩進入戶內，打開門窗通風後，即可恢復正常作息，如須清理戶內環境，使用一般家用清潔劑即可達成清潔目的。

Q5：配合噴藥可請公假，半天或一天？一戶可幾人請？

A5：公假時間的給予，原則上每次最多以一日為限，由現場防疫人員依實際配合狀況提供請假證明單。另配合登革熱防治工作，衛生單位開立之請假證明一戶開立一張，原則上僅供一人使用。

Q6：住家附近環境髒亂擔心感染，可洽何單位處理？

A6：可先向當地里長或環保單位反應，另亦可至環保署網站首頁之清淨家園顧厝邊綠色生活網直接進行通報。

Q7：家人確診感染是否需隔離？公司是否可給予公假休養？

A7：無強制隔離規定，但感染登革熱民眾，應於發病後5日內預防被病媒蚊叮咬，病房應加裝紗窗、紗門，病人可睡在蚊帳內。另請假問題，請依公司規定請假。

Q8：欲赴南部出差，詢問如何預防感染？

A8：外出活動時應穿著淺色長袖長褲，裸露處噴防蚊液，避免蚊蟲叮咬。

Q9：自覺疑似感染主動就醫，是否可領取通報獎金？

A9：民眾主動至衛生主管機關或其他經中央主管機關指定之傳染病檢體篩檢，經證實為境外移入病例或本土病例，每例得發給通報獎金新臺幣二千五百元。

Q10：登革熱通報定義？

A10：可參考本署全球資訊網/傳染病介紹 > 第二類法定傳染病 > 登革熱 > 通報檢驗 > 傳染病病例定義暨防疫檢體採檢送驗事項，若評估符合通報定義即可進行通報。

資料來源:衛生福利部疾病管制署

校園蚊子最愛的地方 你清了嗎？



廁所馬桶



花盆底盤



水溝



洗手台下方



打掃用具



瓶罐空箱



冷卻水塔



塑膠布、帆布



樹洞



清除孳生源4步驟

1 巡

經常巡檢，
避免戶內外積水

2 倒

清除積水，
必要的容器倒置

3 清

容器減量，
清除不要的容器

刷

刷洗容器，
避免蟲卵再附著

